

愛媛県特別栽培農産物平成30年度産 イチジク病害虫防除指針(生産者用)

北条イチジク部会

1 病害虫防除計画(1)露地

施用時期		減農薬栽培					
栽培 ステージ	標準 時期	対象病害虫 及び雑草名等	使用農薬名	使用基準		代替技術	年間総使用回数 (厳守)
				使用倍数	収穫前日数		
発芽前	12月	カイガラムシ類		14倍	発芽前まで	クミアイ機械油 乳剤95	無し
				7倍	発芽前まで		石灰硫黄合剤
	5月	そうか病	トリフミン水和剤	2,000倍	7日前まで		2回まで
		イチジクモンサビダニ	サンマイト水和剤	1,000倍	45日前まで		1回まで
	6月	そうか病	アミスター10 フロアブル	1,000倍	収穫前日まで		1回まで
		ケムシ類		1,000倍	収穫前日まで	ファイブスター 顆粒水和剤	無し
		カイガラムシ類	アプロードエースフ ロアブル	1,000倍	14日前まで		1回まで
7月	そうか病	トリフミン水和剤	2,000倍	7日前まで		2回まで	
	アザミウマ類 カイガラムシ類	モスピラン(顆水)	2,000倍	収穫前日まで		2回まで	
	ハダニ類		2,000倍	収穫前日まで	コロマイト 水和剤	1回まで	
収穫時期	8月	黒かび病	トップジンM 水和剤	1,500倍	7日前まで		1回まで
		キボシカミキリ カイガラムシ類	モスピラン(顆水)	2,000倍	収穫前日まで		2回まで

除草剤散布計画(露地)

施用時期		減農薬栽培					
栽培 ステージ	標準 時期	対象病害虫 及び雑草名等	使用農薬名	使用基準		代替技術	年間総使用回数 (厳守)
				使用倍数	収穫前日数		
雑草 生育期		1年生雑草 多年生雑草	バスタ液剤 又は プリグロックスL	135~300倍 150倍	21日前まで 前日まで		バスタ・プリグロッ クスL 合わせて2回まで

2 病害虫・雑草防除計画(2)ハウス

施用時期		減農薬栽培					
栽培 ステージ	標準 時期	対象病害虫 及び雑草名等	使用農薬名	使用基準		代替技術	年間総使用回数 (厳守)
				使用倍数	収穫前日数		
発芽前	12月	カイガラムシ類		14倍	発芽前まで	クミアイ機械油 乳剤95	無し
				7倍	発芽前まで	石灰硫黄合剤	無し
	5月	そうか病	トリフミン水和剤	2,000倍	7日前まで		2回まで
		イチジクモンサビダニ	サンマイルト水和 剤	1,000倍	45日前まで		1回まで
	6月	ケムシ類		1,000倍	収穫前日まで	ファイブスター 顆粒水和剤	無し
		カイガラムシ類	アプロードエースフ ロアブル	1,000倍	14日前まで		1回まで
収穫時期 S	7月	そうか病	トリフミン水和剤	2,000倍	7日前まで		2回まで
		アザミウマ類 カイガラムシ類	モスピラン(顆水)	2,000倍	収穫前日まで		2回まで
		ハダニ類		2,000倍	収穫前日まで	コロマイルト 水和剤	1回まで
	8月上旬	黒かび病	トップジンM 水和剤	1,500倍	7日前まで		1回まで
		ハダニ類	スターマイルト フロアブル	2,000倍	収穫前日まで		1回まで
		キボシカミキリ カイガラムシ類	モスピラン(顆水)	2,000倍	収穫前日まで		2回まで
	8月中・ 下旬	疫病	ランマン フロアブル	2,000倍	収穫前日まで		1回まで
		さび病	ラリー水和剤	2,000倍	収穫前日まで		1回まで

除草剤散布計画(ハウス)

施用時期		減農薬栽培					
栽培 ステージ	標準 時期	対象病害虫 及び雑草名等	使用農薬名	使用基準		代替技術	年間総使用回数 (厳守)
				使用倍数	収穫前日数		
雑草 生育期		1年生雑草 多年生雑草				防草シート による抑草 又は草刈り による除草	無し